

## ДИАГНОСТИКА КАРИЕСА

Изденова Г.О.

Клиника «Стом-икс»

Кариес зубов – это патологический процесс, характеризующийся очаговой деминерализацией твердых тканей зуба с образованием дефекта в виде полости, способный обостряться, стабилизироваться, приобретать различную активность и находится в разной степени компенсации хронического патологического процесса.

Состояние организма и, в частности, перенесенные и сопутствующие заболевания, также оказывают определенное влияние на степень пораженности зубов кариесом.

По глубине поражения различают: начальный, поверхностный, средний, глубокий.

Большое значение в развитии кариозного процесса имеет состояние иммунной системы, эндокринных желез и пищеварительной системы. В зависимости от состояния

организма течение кариеса может быть острым и хроническим.

### Материал и методы:

Лица, обратившиеся в стоматологическую клинику с целью профилактического осмотра в возрасте 30-35 лет. Осмотр полости рта и анализ состояния имеющихся кариозных полостей в полости рта, сбор анамнеза.

### Результаты и обсуждение:

Осмотрено 53 пациента, из них острый кариес имели 32 пациента, хронический кариес-21. Анамнез подтвердил наличие многих хронических заболеваний у лиц с острым течением кариозного процесса. Для острого течения кариеса характерно наличие светлого, влажного дентина. Для хронического течения - пигментация дентина, твердый дентин.

Таблица 1. - Наличие хронических заболеваний у осмотренных пациентов

Не имеют хронических заболеваний	Имеют одно хроническое заболевание	Имеют более одного хронического заболевания
18	19	16

Из таблицы видно, что 66% осмотренных пациентов имеют какое-либо хроническое заболевание, что влияет на течение кариозных процессов. Полость рта затрагивается патологическими процессами, происходящими в организме. При осмотре установлено: при остром течении кариес развивается в короткие сроки. Кариозная полость заполнена размягченным, светлым, влажным дентином, легко снимающимся экскаватором; при хроническом течении отмечается твердый, пигментированный дентин, процесс находится в стадии стабилизации. При остром кариесе зуб

беспокоит при воздействии химических и температурных раздражителей, при хроническом течении - не беспокоит.

### Выводы

В результате проведенного анализа и оценки кариозных полостей у лиц в возрасте 30-35 лет установлено, что форма развития кариеса находится в прямой зависимости от состояния организма человека.

### Литература:

1. Грошиков М.И. Профилактика и лечение кариеса зубов, - Медицина. 1999 г. - С. 12